

- II, 250. *Trochus t. fulvus* (L.). — Sastopams kā pēriņš pie ezeriem, kuri atrodas Iuriķi jūrmalai, kā Kurzemē tā arī Vīķezē.
- II, 251. *Trochus sinuatus* (Gmel.). — 1871. g. vasarā novauts pie Tērbatas (Russoff), 1908. g. vasarā pie Baltijas jūras. Igaunijā (O. Koch L. c.).
- II, 252. *Pleurocypris felicinus* (L.). — Pērē Šāmsali (Korr.-Bl. LII).
- II, 253. *Baumanniella a. semirete* L. — D. M. atrodas eksemplari, novauti 1845. g. Šāmsali, 1871. g. novērots jūrmalā pie Tallinas (Russoff; Orns) un 1909. g. pie Kasarjes apes Igaunijā (H. Baron Loudon un H. A. Buturin, Journ. L. Ornithol. 1909).
- II, 254. *Lissomus l. lissomus* L. — Kā pēriņš atrasts Šāmsali (F. E. Stell, Korr.-Bl. LII p. 101).
- II, 255. *Nucella lapillus* Vieill. — Prēparators E. Kaeppele (Rīga) 1926. g. radens snipēm vienu eksemplaru, novautu Vēo-Gulbenē.
- II, 256. *Nucella lapillus planospes* (L.). — Kā pēriņš atrasts Igaunijā (O. Koch L. c.) un uz salām (Härmes, raskliski). Pērē Lubinas apkārtne „Olge”-purvā (Dr. VII k.s.).
- II, 257. *Oikopleura leucophaea* (Temm.). — 1871. g. kā pēriņš atrasts pie Kasarjes apes, Igaunijā (V. Russoff; Orns). 10.V. 1908. novērots Rīga, pilnības ganibās (A. L. Grosser).